

ANESTESIA: QUÉ ESPERAR

Información para el paciente

En **Central Texas Endoscopy Center**, nuestro equipo de profesionales se centra en su seguridad y comodidad. El núcleo de este esfuerzo es nuestro grupo de enfermeros anestesistas registrados certificados (CRNA, por sus siglas en inglés) altamente capacitados y experimentados.

ENFERMERO ANESTESISTA REGISTRADO CERTIFICADO (CRNA):



- Un CRNA evaluará cuidadosamente su historial de salud. Un CRNA se reunirá con usted antes del procedimiento para responder sus preguntas y conversar acerca del plan para su sedación
- Un CRNA administrará un plan de sedación personalizado adaptado a su procedimiento y estado médico. Un CRNA le monitoreará durante el procedimiento
- Un CRNA supervisará su recuperación de la anestesia después del procedimiento



ANESTESIA:

PROPOFOL ralentiza la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Se utiliza para hacer que se duerma y mantenerle dormido durante la anestesia para cirugía o otros procedimientos médicos.

- El propofol se inyecta en una vena a través de una vía intravenosa. Un CRNA le aplicará esta inyección. Se relajará y dormirá muy rápidamente tras la inyección de propofol.
- Su respiración, presión arterial, niveles de oxígeno y otros signos vitales se vigilarán atentamente mientras esté bajo los efectos del propofol.
- Antes de que se lo administren, infórmeme a su médico sobre todas sus afecciones médicas y alergias.

Tenga en cuenta que podrían utilizarse otros medicamentos para sedarle durante el procedimiento.



Entre los EFECTOS SECUNDARIOS POTENCIALES se encuentran:

- Comezón o erupción cutánea leves
- Frecuencia cardíaca rápida o lenta
- Presión arterial alta o baja
- Apnea (respiración lenta)
- Ligero ardor, escozor o dolor alrededor de la zona de inserción de la vía intravenosa

Infórmeme de inmediato a su cuidador, si tiene:

- Sensación de mareo (como si se fuera a desmayar) incluso después de sentirse despierto
- Respiración débil o superficial
- Dolor o molestias en el lugar donde se aplica la inyección

Busque atención médica de emergencia si presenta cualquier señal de reacción alérgica al propofol, como urticaria (ronchas/ colmenas en la piel), dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta.



RECORDATORIOS IMPORTANTES SOBRE LA ANESTESIA

- Los medicamentos anestésicos provocan somnolencia y mareos intensos que pueden durar varias horas. Tomar otros medicamentos que le den sueño o ralenticen la respiración puede empeorar estos efectos
- USTED DEBERÁ tener a alguien que le lleve a casa después del procedimiento
- NO conduzca ni opere maquinaria hasta el día siguiente
- NO tome ninguna decisión importante ni firme ningún documento legal hasta el día siguiente
- NO beba alcohol hasta el día siguiente

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a su médico gastroenterólogo al 979-776-4600 o comuníquese con Central Texas Endoscopy Center llamando al 979-774-4211.